



Quality
Standards

Fiche D'information Et De Données : Fracture de la hanche

Soins aux personnes qui ont des fractures de fragilisation

Raison pour laquelle cette norme de qualité est nécessaire

Qualité des services
de santé Ontario

Améliorons notre système de santé

Les normes de qualité sont :

- des énoncés concis faciles à comprendre qui décrivent ce en quoi doivent consister les soins prodigués aux personnes atteintes d'une affection particulière;
- fondés sur les meilleures preuves disponibles;
- accompagnés d'indicateurs de la qualité qui permettent aux organismes de mesurer leur performance;
- conçues pour les fournisseurs de soins de santé pour qu'ils sachent quels soins ils doivent offrir et comment les mesurer;
- aussi conçues pour que les patients, résidents, familles et aidants sachent à quels soins ils doivent s'attendre.

Objet de cette fiche

En Ontario, environ 13 000 personnes ont une fracture de la hanche chaque année.

Environ 20 % d'entre elles meurent au cours de l'année qui suit la fracture, une autre tranche de 20 % qui était autonome avant la fracture sera admise dans un foyer de soins de longue durée et moins de la moitié de ces personnes pourront marcher sans aide.

Cette fiche d'information contient des données et des renseignements qui démontrent pourquoi une norme de qualité doit être établie pour les personnes qui ont une fracture de la hanche.

Cette fiche n'est ni un bulletin de notes ni un rapport pour les fournisseurs de soins de santé, mais plutôt une base de référence qui présente les résultats actuels.

OBJET DE CETTE FICHE CONTINUÉ

Les données contenues dans cette fiche démontrent que les soins prodigués aux personnes qui ont une fracture de la hanche doivent être améliorés en Ontario.

Cette norme de qualité :

- informe les cliniciens et les organismes en quoi consistent des soins de haute qualité pour les personnes atteintes de l'affection en question;
- aide les cliniciens et les organismes à évaluer la qualité des soins qu'ils prodiguent et de déterminer les lacunes et les domaines à améliorer.

Façon dont nous analysons les données

L'information présentée reflète différentes perspectives :

- Les résultats provinciaux au fil du temps présentent une image générale du système et soulignent les tendances.
- Les résultats par RLISS soulignent certaines différences locales.
- Les résultats par établissement présentent une image de la manière dont les pratiques varient entre hôpitaux.



Fracture de la hanche: Les données

Mortalité à 30 et 90 jours : contexte


- Une fracture de la hanche peut être un événement catastrophique qui déclenche un déclin rapide de la santé et de l'autonomie, et un certain nombre de personnes meurent après avoir subi une fracture. Afin de démontrer l'ampleur du problème, nous étudions les taux de mortalité à 30 et 90 jours pour les fractures de la hanche.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours pour les fractures de la hanche en Ontario a légèrement diminué au cours des cinq dernières années.

Taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours pour les fractures de la hanche, en Ontario, 2011 à 2015

Pourcentage



Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDCP), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.


Nota : Taux bruts.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours pour les fractures de la hanche en Ontario varie d'un RLISS à l'autre, allant de 4.3 % à 10.5 %.

Taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours pour les fractures de la hanche, par RLISS, 2015

Pourcentage



Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDPC), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.


Nota : La région du RLISS se rapporte à l'emplacement de l'hôpital où la personne a été opérée pour une fracture de la hanche. Les résultats sont rajustés en fonction du risque.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours pour les fractures de la hanche varie entre les 50 principaux hôpitaux de l'Ontario qui affichent le volume le plus élevé de congés, allant de 2,7 % à 15,0 %.

Taux de mortalité à 30 jours pour les 50 principaux hôpitaux, en Ontario, 2015

Pourcentage



50 principaux hôpitaux affichant le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche.

Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDGP), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.


Nota : Les résultats sont rajustés en fonction du risque.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le taux de mortalité toutes causes confondues à 90 jours pour les fractures de la hanche en Ontario a diminué au cours des cinq dernières années.

Taux de mortalité toutes causes confondues à 90 jours pour les fractures de la hanche, en Ontario, 2011 à 2015

Pourcentage



Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDGP), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.


Nota : Taux bruts.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le taux de mortalité toutes causes confondues à 90 jours pour les fractures de la hanche en Ontario varie d'un RLISS à l'autre, allant de 9,3 % à 18,6 %.

Taux de mortalité toutes causes confondues à 90 jours pour les fractures de la hanche, par RLISS, 2015

Pourcentage



Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDGP), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.


Nota : La région du RLISS se rapporte à l'emplacement of the hospital the hip fracture patient was discharged from. Les résultats sont rajustés en fonction du risque.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le taux de mortalité toutes causes confondues à 90 jours pour les fractures de la hanche varie entre les 50 hôpitaux de l'Ontario qui affichent le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche, allant de 4,8 % à 22,6 %.

Taux de mortalité toutes causes confondues à 90 jours pour les 50 hôpitaux de l'Ontario qui affichent le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche, en Ontario, 2015

Pourcentage



50 hôpitaux de l'Ontario affichant le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche

Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDPC), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.

Nota : Les résultats sont rajustés en fonction du risque.

Pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures : contexte




- Puisque la norme de qualité indique qu'il est important de poser une fixation chirurgicale dans les 48 heures qui suivent l'arrivée à l'hôpital (incluant le temps passé dans un hôpital non chirurgical), nous examinons le pourcentage de fractures de la hanche qui ont été opérées au cours de cette période.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures qui ont suivi l'arrivée à l'hôpital, en Ontario, a augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 73,5 % en 2011-2012 à 80,1 % en 2015-2016.

Pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures qui ont suivi l'arrivée à l'hôpital, en Ontario, 2011-12 à 2015-16

Pourcentage




Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDGP), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures qui ont suivi l'arrivée à l'hôpital varie d'un RLISS à l'autre, allant de 70,2 % à 91,6 %.

Pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures qui ont suivi l'arrivée à l'hôpital, par RLISS, 2015-2016

Pourcentage



Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDGP), Système national d'information sur les soins ambulatoires. (SNISA), fourni par le MSSLD.


Nota : La région du RLISS se rapporte à l'emplacement de l'hôpital où la personne a été opérée pour une fracture de la hanche

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures qui ont suivi l'arrivée à l'hôpital varie entre les 50 hôpitaux qui affichent le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche, allant de 54,9 % à 96,4 %.

Pourcentage de fractures de la hanche opérées dans les 48 heures qui ont suivi l'arrivée à l'hôpital pour les 50 hôpitaux qui affichent le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche, 2015-2016

Pourcentage



50 hôpitaux qui affichent le volume le plus élevé de congés après une fracture de la hanche

Gestion des urgences : contexte


- Puisque les normes de qualité ont pour but d'améliorer la façon dont les services des urgences sont gérés, y compris l'admission et le transfert des patients dans un lit d'hôpital dans les huit heures qui suivent l'arrivée à l'hôpital, nous examinons le pourcentage de personnes admises au cours de cette période.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de patients qui ont reçu une fixation chirurgicale et ont été hospitalisés dans les huit heures est resté relativement stable au cours des trois dernières années.

Pourcentage de patients qui ont reçu une fixation chirurgicale et été hospitalisés dans les huit heures, en Ontario, 2013 à 2015

Pourcentage




PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de personnes qui ont reçu une fixation chirurgicale et été hospitalisées dans les huit heures varie entre 54 % et 84 %

Pourcentage de patients qui ont reçu une fixation chirurgicale et été hospitalisés dans les huit heures, en Ontario, par RLISS, 2014-2015

Pourcentage




Région du réseau local d'intégration des services de santé (RLISS)

PRINCIPALE CONCLUSION

Il y a des écarts considérables dans le pourcentage de personnes qui ont reçu une fixation chirurgicale et été hospitalisées dans les huit heures entre les 50 hôpitaux qui affichent le volume le plus élevé.

Pourcentage de patients qui ont reçu une fixation chirurgicale et été hospitalisés dans les huit heures, 50 hôpitaux affichant le volume le plus élevé, en Ontario, 2014-2015

Pourcentage



Transfusions sanguines postopératoires : contexte




- Puisque les normes de qualité indiquent qu'il est important, dans le cas d'une fracture de la hanche, de ne pas faire de transfusion sanguine si la personne ne présente pas de symptômes et a un taux d'hémoglobine postopératoire égal ou supérieur à 80 g/L, nous signalons le pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine en Ontario a diminué légèrement entre 2013 et 2015.

Pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine en Ontario, 2013-2015

Pourcentage




Source des données : Base de données sur les congés des patients (BDGP) consultée par l'entremise de SavoirSanté Ontario, MSSLD.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine varie considérablement d'un RLISS à l'autre.

Pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine en Ontario, par RLISS, exercice 2015

Pourcentage




Région du réseau local d'intégration des services de santé (RLISS)

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine varie considérablement entre les 50 principaux hôpitaux, par volume.


Pourcentage de fractures de la hanche suivies d'une transfusion sanguine, 50 hôpitaux de l'Ontario affichant le volume le plus élevé, exercice 2015

Pourcentage



Autres ressources

Cette fiche d'information a pour but d'étayer la norme relative aux fractures de la hanche, qui est consultable dans son intégralité sur le site Web de Qualité des services de santé Ontario.



A white square with a thin border containing the text "Quality Standards" in white.

Quality
Standards

For more information:

Website: hqontario.ca/normesdequalite

Contact Us: qualitystandards@hqontario.ca

Qualité des services
de santé Ontario

Améliorons notre système de santé