


RAISON D'ÊTRE D'UNE NORME DE QUALITÉ SUR

la prescription d'opioïdes pour soulager la douleur en Ontario

Malgré les risques considérables associés à l'utilisation d'opioïdes, **qui comprennent notamment la dépendance, la surdose et de la mort**, les opioïdes sont souvent prescrits pour gérer la douleur.


En 2016, 1 personne sur 9 en Ontario a reçu des opioïdes pour traiter leur douleur. **Au cours des 20 dernières années, une hausse considérable du taux de prescription d'opioïdes dans la province a eu lieu** ainsi qu'une hausse des consultations aux services des urgences, du nombre d'hospitalisations et du nombre de décès liés aux opioïdes¹.



En Ontario, près d'une nouvelle ordonnance pour des opioïdes sur cinq dépasse la dose maximale recommandée pour les personnes qui ne prennent pas régulièrement des opioïdes, c'est-à-dire 50 mg d'équivalent morphine par jour. Les doses plus fortes augmentent les risques de surdose et de décès.²


Les ordonnances nouvelles sont des ordonnances exécutées pour des personnes qui n'ont pas fait exécuter d'ordonnance pour des opioïdes depuis six mois.

En 2016, la proportion d'ordonnances nouvelles pour des opioïdes qui dépassent la dose maximale recommandée **variait d'une région à l'autre, allant de 15 % à 23,3 %**.




En Ontario, environ une ordonnance nouvelle d'opioïdes prescrite par un chirurgien sur neuf, probablement pour soulager une douleur aiguë, donne accès à des médicaments pour plus de sept jours.

La prescription d'opioïdes pour plus de sept jours est associée à un **risque environ deux fois plus élevé d'utilisation continue un an plus tard.**³



La proportion d'ordonnances nouvelles d'opioïdes prescrites par des chirurgiens pour des périodes de plus de sept jours **variait d'une région à l'autre en 2016**.



Le nombre de consultations aux services des urgences liées aux opioïdes **a augmenté considérablement** en Ontario au cours des dernières années.



CONSULTATIONS AUX SERVICES DES URGENCES

32 personnes sur 100 000 en **2016**

23 personnes sur 10 000 en **2013**⁴

Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité des soins prodigués aux personnes atteintes de douleur aiguë ou chronique qui se sont fait prescrire ou envisagent de prendre des opioïdes.

C'est pourquoi Qualité des services de santé Ontario, en collaboration avec des fournisseurs de soins de santé, des personnes qui sont atteintes de douleur aiguë ou chronique et leurs familles et leurs personnes soignantes, a élaboré cette norme de qualité décrivant les caractéristiques des soins de qualité.

hqontario.ca/normesdequalite

Normes de qualité

¹ Martins, D., S. Greaves, M. Tadrous, M. Paterson, D. Bandola, S. Singh et coll. Opioid use and related adverse events in Ontario [Internet], Toronto (Ontario), Ontario Drug Policy Research Network, 2016 [cité en novembre 2016]. Accessible à l'adresse : <http://odprn.ca/wp-content/uploads/2016/11/ODPRN-Opioid-Use-and-Related-Adverse-Events-Nov-2016.pdf>

² Bohnert, A.S., M. Valenstein, M.J. Bair et coll. « Association between opioid prescribing patterns and opioid overdose-related deaths », JAMA, vol. 305 (2011), pp. 1315 à 1321.

³ Shah, A., C.J. Hayes et B.C. Martin. « Characteristics of initial prescription episodes and likelihood of long-term opioid use - United States, 2006-2015 », MMWR Morb Mortal Wkly Rep, vol. 66, no 10 (2017), pp. 265 à 269.

⁴ Santé publique Ontario, Morbidité et mortalité liées aux opioïdes en Ontario. Consulté le 22 septembre 2017 à l'adresse : <http://www.publichealthontario.ca/en/dataanalytics/pages/opioid.aspx#maps>

ISBN 978-1-4868-1729-0 (PDF) © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018

Qualité des services de santé Ontario

Améliorons notre système de santé