

**Normes
de qualité**

Plaies de pression : soins aux patients de tous les milieux de soins

**Qualité des services
de santé Ontario**

Améliorons notre système de santé

 **Ontario**
Qualité des services
de santé Ontario

Les normes de qualité sont :

- Des ensembles concis d'énoncés faciles à comprendre décrivant les caractéristiques des soins pour une affection donnée;
- Fondées sur les meilleures données disponibles;
- Accompagnées d'indicateurs de la qualité permettant aux organisations de faire un suivi de la qualité de leurs soins;
- Conçues pour aider les fournisseurs de soins de santé à connaître les soins qu'ils devraient fournir et la façon de les évaluer;
- Conçues pour aider les patients, les résidents, les familles et le personnel soignant à savoir quelles questions poser en lien avec leurs soins.

Contenu du résumé

Les plaies constituent une perturbation de la fonction protectrice de la peau et représentent un important fardeau pour les patients et leur famille, le personnel soignant, les médecins et le système de santé de l'Ontario. Il existe plusieurs types de plaies.

Ce document contient des données et des informations sur les plaies de pression.

Méthodologie, références, remerciements et autres renseignements.

Pourquoi cette norme est-elle nécessaire?

- Les personnes souffrant d'une plaie de pression sont plus susceptibles d'avoir une moins bonne qualité de vie liée à la santé¹, de souffrir de dépression² et de ressentir de la douleur et de l'inconfort^{3, 4}.
- Une plaie de pression est une lésion de la peau et des tissus mous sous-jacents, généralement située sur une protubérance osseuse ou associée à un dispositif médical ou à un autre dispositif, résultant d'une pression intense ou prolongée, ou d'un cisaillement⁵.
- Les personnes qui courent le risque le plus élevé sont les personnes âgées, les résidents d'établissement de soins de longue durée ou de soins aux malades en phase critique et les personnes qui ont une maladie grave, qui ont subi un traumatisme, qui ont une blessure à la colonne, qui sont atteintes d'un trouble neurologique, qui souffrent du diabète, qui ont une mobilité réduite ou qui ont une carence nutritionnelle^{6, 7}.
- Les données présentées ici ne précisent pas la manière dont une nouvelle plaie s'est développée ou une plaie existante s'est dégradée. En d'autres mots, il nous est impossible de déterminer si une plaie s'est développée à la suite d'une courte visite dans un autre établissement.
- De plus, les données ne permettent pas de savoir comment ces plaies sont traitées en raison du manque de renseignements sur la prise en charge de chaque plaie de pression.




Plaies de pression : les données

PRINCIPALE CONCLUSION

Les taux d'hospitalisation pour une plaie de pression varient d'une région de l'Ontario à l'autre, le plus haut taux étant un peu plus de trois fois plus élevé que le plus faible.

Taux d'hospitalisation pour une plaie de pression, pour 100 000 personnes en Ontario, par régions du RLSS, 2014-2015


Taux pour 100 000 personnes



PRINCIPALE CONCLUSION

Les patients hospitalisés ayant une plaie de pression sont traités dans divers milieux de soins; c'est pourquoi la collaboration interprofessionnelle d'un milieu à l'autre est importante.

Destination prévue des patients ayant une plaie de pression, Ontario, 2014-2015




Note : Les établissements de soins continus comprennent les établissements de soins de longue durée, les établissements de soins continus complexes et les établissements de réadaptation pour patients hospitalisés.

Source : Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins continus complexes qui ont développé une nouvelle plaie de pression ou dont la plaie s'est détériorée depuis la dernière évaluation varie d'une région du RLISS à l'autre, le pourcentage le plus élevé étant plus de trois fois plus élevé que le plus bas.


Pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins continus complexes ayant développé une nouvelle plaie de pression ou dont la plaie s'est détériorée, en Ontario, par régions du RLISS, 2015-2016



PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins de longue durée qui ont développé une nouvelle plaie de pression ou dont la plaie s'est détériorée depuis la dernière évaluation dans les diverses régions du RLISS s'étend de 2,0 % à 3,5 %.

Pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins de longue durée ayant développé une nouvelle plaie de pression ou dont la plaie s'est détériorée, en Ontario, par régions du RLISS, 2015-2016




Note : Les résultats sont ajustés en fonction du risque. Source : Système d'information sur les soins de longue durée, Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

PRINCIPALE CONCLUSION

Le pourcentage de patients recevant des soins à domicile qui ont développé une nouvelle plaie de pression depuis la dernière évaluation varie d'une région de l'Ontario à l'autre, le pourcentage le plus élevé étant deux fois plus élevé que le plus bas.

Pourcentage de patients recevant des soins à domicile ayant développé une nouvelle plaie de pression, en Ontario, par régions du RLISS, 2015-2016



Note : Les résultats sont ajustés en fonction du risque. Source : Système d'information sur les services à domicile, Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

Notes méthodologiques : plaies de pression

Indicateur	Numérateur	Dénominateur	Sources	Remarques
Taux d'hospitalisation pour une plaie de pression, pour 100 000 personnes en Ontario, par régions du RLISS, 2014-2015.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur ayant été hospitalisées pour une plaie de pression.	Nombre de personnes dans la population.	Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.	Les données incluent les patients ayant un diagnostic principal de plaie de pression (avant l'admission).
Destination prévue des patients ayant une plaie de pression après leur congé, Ontario, 2014-2015.	Destination prévue après le congé.	Nombre de personnes présentant un diagnostic primaire de plaie de pression qui ont reçu leur congé.	Base de données sur les congés des patients, ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO.	Les données incluent les patients ayant un diagnostic principal de plaie de pression.
Taux de patients hospitalisés dans un établissement de soins continus complexes ayant développé une nouvelle plaie de pression ou dont la plaie s'est détériorée, en Ontario, par régions du RLISS, 2014-2015.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur ayant une nouvelle plaie de pression ou une plaie de pression qui s'est détériorée.	Pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins continus complexes.	Système d'information sur les soins de longue durée de l'Institut canadien d'information sur la santé.	Données ajustées en fonction du risque.
Pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins de longue durée ayant développé une nouvelle plaie de pression ou dont la plaie s'est détériorée, en Ontario, par régions du RLISS, 2015-2016.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur ayant une nouvelle plaie de pression ou une plaie de pression qui s'est détériorée.	Pourcentage de patients hospitalisés dans un établissement de soins de longue durée.	Système d'information sur les soins de longue durée de l'Institut canadien d'information sur la santé.	Données ajustées en fonction du risque.
Pourcentage de patients recevant des soins à domicile ayant développé une nouvelle plaie de pression, en Ontario, par régions du RLISS, 2015-2016.	Nombre de personnes incluses dans le dénominateur ayant une nouvelle plaie de pression.	Pourcentage de patients recevant des soins à domicile de longue durée.	Système d'information sur les soins de longue durée de l'Institut canadien d'information sur la santé.	Données ajustées en fonction du risque.

Références

1. Thein, H.H., T. Gomes, M.D. Krahn, et W.P. Wodchis. « Health status utilities and the impact of pressure ulcers in long-term care residents in Ontario », *Quality of Life Research*, vol. 19, no 1, 2010, p. 81-89.
2. Galhardo, V. A., M. Garroni Magalhaes, L. Blanes, Y. Juliano et L. Masako Ferreira. « Health-related Quality of Life and Depression in Older Patients With Pressure Ulcers », *Wounds*, vol. 22, no 1, 2010, p. 20-26.
3. Essex, H. N., M. Clark, J. Sims, A. Warriner et N. Cullum. « Health-related quality of life in hospital inpatients with pressure ulceration: assessment using generic health-related quality of life measures », *Wound Repair and Regeneration*, vol. 17, no 6, 2009, p. 797-805.
4. Gorecki, C., S. J. Closs, J. Nixon et M. Briggs. « Patient-reported pressure ulcer pain: a mixed-methods systematic review », *Journal of Pain and Symptom Management*, vol. 42, no 3, 2011, p. 443-459.
5. National Pressure Ulcer Advisory Panel. *National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) announces a change in terminology from pressure ulcer to pressure injury and updates the stages of pressure injury* [communiqué de presse], c2016, [En ligne], Washington, 13 avril 2016 (consulté le 25 avril 2016). [<http://www.npuap.org/national-pressure-ulcer-advisory-panel-npuap-announces-a-change-in-terminology-from-pressure-ulcer-to-pressure-injury-and-updates-the-stages-of-pressure-injury/>]
6. National Institute for Health and Care Excellence. *Pressure ulcers: prevention and management*, Londres, 2014.
7. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline*, Washington, 2014.

Remerciements

Qualité des services de santé Ontario tient à remercier Joshua Moralejo, responsable de l'exercice professionnel infirmier, le Toronto Grace Health Centre de l'Armée du Salut ainsi que Connie Paris, gestionnaire de l'intégration des rapports électroniques de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) pour la révision de du présent résumé.

Ressources supplémentaires

Ce document d'information vise à étayer la norme de qualité pour les plaies de pression, qui se trouve intégralement sur la page [Normes de qualité du site Web](#) de Qualité des services de santé Ontario.



Normes
de qualité

Renseignements :

site Internet : hqontario.ca/normesdequalite

Communiquer avec nous : qualitystandards@hqontario.ca

Qualité des services
de santé Ontario

Améliorons notre système de santé

 **Ontario**
Qualité des services
de santé Ontario